

## 学校感染症による出席停止の手続きについて

山形県立山形東高等学校長

学校は集団生活の場であるため、学校保健安全法第19条に基づき、校長は、学校感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある生徒を出席停止にすることができます。また、学校保健安全法第20条により、学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業（学校閉鎖、学級閉鎖）を行うことができます。

医師に下記の感染症と診断された場合、指示された期間の出席停止となりますので、その旨をただちに担任へ電話報告し、復帰後すぐに「受診報告書」を提出してください。「受診報告書」の＜医療機関記入欄＞には、必ず受診した医療機関でご記入いただけてください。\*

\*ただし、流行期にインフルエンザの診断を受け、医療機関に「受診報告書」への記入を断られた場合に限り、保護者が医師の指示内容を記入し、医療機関名・受診日・診断名が明記された薬の説明書等を添付して提出してください。

学校での感染拡大を防ぐため、下記の出席停止期間を守るよう十分注意してください。

### 【学校感染症の種類と出席停止期間】

| 種   | 病名                                                                                                                                        | 出席停止期間のめやす                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症                      | 完全に治癒するまで                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 第二種 | ① <u>インフルエンザ</u> （特定鳥インフルエンザを除く）<br>② 百日咳<br>③ 麻疹<br>④ 流行性耳下腺炎<br><br>⑤ 風しん<br>⑥ 水痘<br>⑦ 咽頭結膜熱（プール熱）<br>⑧ 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎                    | ① <u>発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで</u> ↓<br>（発症日の翌日から数えて最低5日間は登校不可）<br>② 特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで<br>③ 解熱後三日を経過するまで<br>④ 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで<br>⑤ 発疹が消失するまで<br>⑥ 全ての発疹が痂皮化するまで<br>⑦ 主要症状消退後二日を経過するまで<br>⑧ 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
| 第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、 <u>その他の感染症</u> ＊<br>＊ 感染性胃腸炎、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、アタマジラミ、水いぼ 等 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで                                                                                                                                                                                                                                                  |

